

Middelen bij jicht

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Bij aanval			
Advil	ibuprofen		1
Aleve	naproxen		1
Arcoxia	etoricoxib	selectieve COX-2 remmer	2
Brufen	ibuprofen		1
Cataflam	diclofenac	relatief duur	1
Celestone injectie	betamethason	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Colchicine	colchicine	als NSAID, zoals ibuprofen of diclofenac, onvoldoende helpt; ook ter vermindering van aantal aanvallen	2
Depo-Medrol injectie	methylprednisolon	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Dexamethason injectie	dexamethason	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Di-Adreson-F	prednisolon	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Diclofenac	diclofenac		1
Ibuprofen	ibuprofen	meestal het goedkoopst	1
Ilaris	canakinumab	interleukineremmer; als NSAID, prednisolon en colchicine niet geschikt zijn; duur middel	2
Indometacine	indometacine	meer kans op bijwerkingen	2
Kenacort-A injectie	triamcinolonacetonide	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Methylprednisolon injectie	methylprednisolon	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Naproxen	naproxen		1
Nurofen	ibuprofen		1
Piroxicam	piroxicam	relatief veel maagklachten	2
Prednisolon tablet	prednisolon	korte stootkuur is alternatief voor NSAID	1
Prednisolon injectie	prednisolon	corticosteroïd-injectie; laatste keus bij jicht	2
Sarixell	ibuprofen		1
Spidifen	ibuprofen		1
Vimovo	naproxen, esomeprazol	relatief duur	2
Voltaren (K)	diclofenac		1
Ter voorkoming van aanval			
Adenuric	febuxostat	na allopurinol keuzemiddel ter voorkoming aanval; beperkte ervaring mee	2
Allopurinol	allopurinol		1
Desuric	benzbromaron	als allopurinol en febuxostat onvoldoende werkzaam zijn of te veel bijwerkingen geven; leverfunctie controleren!	2
Fasturtec	rasburicase	alleen bij behandeling van bepaalde vormen van kanker	2
Zyloric	allopurinol		2

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel