

# Middelen bij migraine

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
<b>Domperidon</b>	domperidon	keuzemiddel als je erg misselijk bent of moet braken tijdens een migraineaanval	1
<b>Metoclopramide</b>	metoclopramide	keuzemiddel als je erg misselijk bent of moet braken tijdens een migraineaanval; effectiever dan domperidon, maar ook meer kans op bijwerkingen	1
<b>Motilium</b>	domperidon	keuzemiddel als je erg misselijk bent of moet braken tijdens een migraineaanval	1
<b>Primperan</b>	metoclopramide	keuzemiddel als je erg misselijk bent of moet braken tijdens een migraineaanval; effectiever dan domperidon, maar ook meer kans op bijwerkingen	1
<b>Algemene pijnstillers</b>			
<b>Diclofenac</b>	diclofenac	NSAID; alternatief voor paracetamol als dat niet werkt	1
<b>Ibuprofen</b>	ibuprofen	NSAID; alternatief voor paracetamol als dat niet werkt	1
<b>Naproxen</b>	naproxen	NSAID; alternatief voor paracetamol als dat niet werkt	2
<b>Paracetamol</b>	paracetamol	eerste keus	2
<b>Speciale migraine-pijnstillers</b>			
<b>Almogran</b>	almotriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; met dit middel minder ervaring bij artsen; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Almotriptan</b>	almotriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; met dit middel minder ervaring bij artsen; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Ergocoffeïne-zetpil (FNA)</b>	ergotamine, cafeïne	als gewone pijnstillers of triptanen, zoals sumatriptan, onvoldoende effect hebben; kan gunstig zijn bij langdurige migraine-aanvallen (2-3 dagen)	2
<b>Fromirex</b>	frovatriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; met dit middel minder ervaring bij artsen en het lijkt minder goed te werken; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Imigran</b>	sumatriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom hiervoor voorkeur; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten; neuspray, injecties en zetabletten zijn relatief duur, maar soms nuttig	2

\* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
<b>Maxalt</b>	rizatriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; dit middel is alternatief; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Migrafin</b>	metoclopramide, acetylsalicylzuur(lysine)	niet beter dan losse combinatie	2
<b>Naramig</b>	naratriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; let op: werking treedt veel later in dan bij sumatriptan; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Naratriptan</b>	naratriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; let op: werking treedt veel later in dan bij sumatriptan; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Relpax</b>	eletriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; met dit middel minder ervaring bij artsen; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Rizatriptan</b>	rizatriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom daarvoor voorkeur; met dit middel minder ervaring bij artsen; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Sumatriptan (injectie, neusspray, tablet, zetpil)</b>	sumatriptan	als paracetamol of NSAID niet werkt; met sumatriptan veruit meeste ervaring opgedaan; daarom hiervoor voorkeur; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten; injectie bij aanval clusterhoofdpijn eerste keus	2
<b>Zolmitriptan</b>	zolmitriptan	alternatief voor sumatriptan als paracetamol of NSAID niet werkt; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Zomig</b>	zolmitriptan	alternatief voor sumatriptan als paracetamol of NSAID niet werkt; niet geschikt bij bepaalde hart- en vaatziekten	2
<b>Middelen ter voorkoming (bij twee of meer aanvallen per maand)</b>			
<b>Amitriptyline</b>	amitriptyline	komt in aanmerking als bètablokkers, valproïnezuur of topiramaat onvoldoende werkzaam blijken of te veel bijwerkingen geven; ook bij depressie gebruikt	2
<b>Clonidine</b>	clonidine	vermoedelijk niet beter dan nepmiddel bij migraine	N
<b>Depakine</b>	valproïnezuur	eerstekeusmiddel ter voorkoming; ook gebruikt bij epilepsie	1

\* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
<b>Deseril</b>	methysergide	in uitzonderingssituaties door een neuroloog voorgeschreven	2
<b>Dixarit</b>	clonidine	vermoedelijk niet beter dan nepmiddel bij migraine	N
<b>Ergocoffeïne-zetpil (FNA)</b>	ergotamine, cafeïne	ter voorkoming van clusterhoofdpijn	2
<b>Flunarizine</b>	flunarizine	in uitzonderingssituaties door een neuroloog voorgeschreven	2
<b>Lithium</b>	lithium	ter voorkoming van clusterhoofdpijn	2
<b>Metoprolol (Retard)</b>	metoprolol	bètablokker; eerstekeusmiddel ter voorkoming	1
<b>Natriumvalproaat</b>	valproïnezuur	eerstekeusmiddel ter voorkoming; ook gebruikt bij epilepsie	1
<b>Orfiril</b>	valproïnezuur	eerstekeusmiddel ter voorkoming; ook gebruikt bij epilepsie	1
<b>Prednison</b>	prednison	ter voorkoming van clusterhoofdpijn	2
<b>Propranolol</b>	propranolol	bètablokker; eerstekeusmiddel ter voorkoming	1
<b>Sandomigran</b>	pizotifeen	in uitzonderingssituaties door een neuroloog voorgeschreven	2
<b>Selokeen (ZOC)</b>	metoprolol	bètablokker; eerstekeusmiddel ter voorkoming	1
<b>Sibelium</b>	flunarizine	in uitzonderingssituaties door een neuroloog voorgeschreven	2
<b>Topamax</b>	topiramaat	eerstekeusmiddel ter voorkoming; ook gebruikt bij epilepsie	1
<b>Topiramaat</b>	topiramaat	eerstekeusmiddel ter voorkoming; ook gebruikt bij epilepsie	1
<b>Verapamil</b>	verapamil	ter voorkoming van clusterhoofdpijn	1
<b>Zuurstof</b>	zuurstof	bij aanval van clusterhoofdpijn	2

\* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden